

Yeosu Web Contents

2024년 05월 05일 13시 48분



목차

목차	2
보도자료 - 건설	3
여수시, 노로바이러스 식중독 예방 당부	3

보도자료

해명자료

여수시, 노로바이러스 식중독 예방 당부

2021.03.24 조회수 99 담당부서 식품위생과 담당자 서영준 연락처 061-659-4230

- 11월부터 ~ 봄까지 집중적으로 발생, 어패류 등 익혀먹기

여수시(시장 권오봉)가 최근 전라남도의 노로바이러스로 인한 식중독 의심 신고가 증가함에 따라 노로바이러스 예방을 위해 개인위생관리와 식품 위생 관리에 세심한 관심을 기울여 줄 것을 당부하고 나섰다.

노로바이러스 식중독은 날씨가 추워지는 11월부터 봄까지 집중적으로 발생한다. 감염 되면 1~2일 안에 구토, 설사 등의 증상이 나타나고, 그 외 복통, 오한, 발열이 나타나기도 한다.

식품의약품안전처 자료에 따르면 올해 11주 누적 식중독 신고건수는 49건, 환자 수는 781명으로, 2020년 동기 대비 신고 44건 및 환자 수 392명에 비해 각각 11.4%, 99.2%가 증가하고 있는 추세다.

최근 발생한 유치원, 어린이집 등의 식중독 신고 건을 살펴보면 최초 환자 발생 이후 해당 시설 내에서 주변인에게 연속 전파된 것으로 의심되는 식중독 사례들이 다수 확인되고 있다.

여수시 관계자는 “노로바이러스 식중독을 예방하기 위해 손 씻기를 생활화하는 등 개인위생을 철저히 하고 어패류 등 날 음식은 되도록 익혀 먹어야 한다”면서, “특히 많은 사람들이 이용하는 사회 복지시설, 다중이용시설, 집단 급식소와 음식점 등에서 위생관리에 보다 철저한 주의를 기울여 줄 것”을 거듭 당부했다.



Q&A로 알아보는 노로바이러스 식중독 바로알기

Q 노로바이러스 식중독은 다른 식중독에 비해 발생 가능성이 높다?

YES!

노로바이러스는 단 10개 정도만으로도 쉽게 전염을 일으키는 식중독균입니다.

x10 cf. 리스테리아 식중독균은 음식물 1g당 10⁴~10⁶개 정도로 감염 발생.

철저한 개인위생 수칙 준수를 통한 예방이 중요합니다.


상한 음식을 조심하면

Q 노로바이러스 식중독에 걸리지 않는다?

A **NO!**

노로바이러스는 오염된 음식 섭취뿐만 아니라, **사람 간 접촉을 통해서도 전파됩니다.**

따라서 증상이 있다면 가급적 **사람 간 접촉 등을 피해야 합니다.**



식품의약품안전처

Q 노로바이러스 식중독은 겨울철에 발생률이 높다?

A **YES!**

바이러스는 감염 활성이 겨울철에 강해집니다.


노로바이러스는 -20°C에서도 잘 살아남을 수 있고 여름철보다 겨울철에 더 많이 발생합니다.



식품의약품안전처

첨부파일

[전체\(Zip\)다운로드](#)

 **4. 여수시, 노로바이러스 식중독 예방 당부.jpg (400 hit/ 286.7 KB)** ↓

[미리보기](#)

[목록](#)

이전글 < 여수시, 음식물류 폐기물 RFID종량기 100대 설치·

다음글 > 여수시, '한려지구 도시재생뉴딜'...“4월부터 본격·

Yeosu Web Contents

